


Hoe weet ik de uitslag?

Op de achterkant van de aanvraagbon kan u uw persoonlijk e-mailadres invullen. Zodra het labo in UZ Leuven het bloedstaal ontvangt, krijgt u van hen een bevestigingsmail. U kan dan een inlogcode aanvragen. Zodra het bloed onderzocht is, ontvangt u opnieuw een mail dat het resultaat klaar staat op www.mynexuzhealth.be.

Met uw aangevraagde inlogcode kan u enerzijds het resultaat zelf opzoeken en anderzijds het geslacht te weten komen.

De arts die de aanvraagbon voor u maakte, wordt ook op de hoogte gesteld.




Dienst Gynaecologie ZMK

Wat als de test afwijkend is?

Indien er bij de test een vermoeden is van een afwijking raden we aan om dit te laten bevestigen door middel van een vruchtwaterpunctie.

Als u hieromtrent nog vragen heeft, aarzel niet om deze met uw arts of vroedvrouw te bespreken.



Ziekenhuis Maas en Kempen vzw •

Diestersteenweg 425 • 3680 Maaseik • tel. 089

Auteur : dienst Gynaecologie
Versie : Februari 2020
ZMKBr0193

ziekenhuis maas en kempen

Beste patiënte,

Proficiat met uw zwangerschap.

Tijdens uw zwangerschap zal u opgevolgd worden door een team van vroedvrouwen en gynaecologen en kunnen er verschillende onderzoeken gebeuren om te kijken of alles in orde is met u en uw baby. U bepaalt zelf of u deze onderzoeken laat doen.

De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

Tegenwoordig kunnen we het DNA van de baby uit het bloed van de mama filteren. Deze test wordt de NIPT test, of Niet Invasieve Prenatale Test genoemd. Onderzoek van dit DNA kan bepaalde chromosomale afwijkingen aantonen. Sinds 1 juli 2017 wordt dit onderzoek terugbetaald aan patiënten met een Belgisch ziekenfonds.

Wat wordt er getest?

Eén van de meest voorkomende erfelijke aandoeningen is het syndroom van Down, mongolisme of trisomie 21. Verder zijn er nog trisomie 13 (syndroom van Patau) en trisomie 18 (syndroom van Edward). Deze laatste 2 aandoeningen zijn eerder zeldzaam en de meeste van deze baby's sterven reeds in de baarmoeder. De NIPT test kan deze 3 chromosomale afwijkingen opsporen met een zekerheid van 99%. Als je het DNA van een baby hebt, kan je ook het geslacht bepalen.

Wanneer kan ik geen NIPT test laten doen?

- Wanneer u minder dan 12 weken zwanger bent
- Wanneer u recente bloedtransfusie, stamceltherapie, immuuntherapie of transplantatie heeft gehad
- Wanneer u zwanger bent van meer dan 2 baby's

Wanneer is een NIPT test minder betrouwbaar?

- Bij een zwangerschap die aanvankelijk een tweeling was (vanishing twin)
- Bij zwaar overgewicht

Waar en wanneer kan ik de test laten doen?

U kan zonder afspraak terecht op E04 voor een bloedafname samen met uw aanvraagbon. U dient zich aan de inkombalie in te schrijven.

Deze dienst is geopend van maandag tot en met **donderdag** tussen 8u en 17u

Heel soms is het staal van slechte kwaliteit en wordt er gevraagd om een tweede staal te laten afnemen.