

VOORBEELD:

Fleur heeft een keelontsteking met 38,5°C koorts. Ze is 3 jaar en weegt 17 kg. Haar ouders geven haar afwisselend Perdolan® en Nurofen®. Zie volgend schema.

Opgelet: Indien uw kind vredig slaapt, hoeft deze niet gewekt te worden om de medicatie toe te dienen.

Er moeten minstens 3 uren tussen twee opeenvolgende medicatie toedieningen zitten. Indien mogelijk mag dit ook over een langere tijd gespreid worden.

Voorbeeld Fleur (3 jaar, 17kg):

Medicament	Tijdstip	Dosis (Afhankelijk van het lichaamsgewicht)
Perdolan®	08:00 u	200 mg
Nurofen®	11:00 u	170 mg
Perdolan®	14:00 u	200 mg
Nurofen®	17:00 u	170 mg
Perdolan®	20:00 u	200 mg
Nurofen®	23:00 u	170 mg
Perdolan®	02:00 u	200 mg

+ 3 uur
+ 3 uur
+ 3 uur
+ 3 uur
+ 3 uur
+ 3 uur

Medicament	Tijdstip	Dosis (Afhankelijk van het lichaamsgewicht)
Perdolan®		
Nurofen®		
Perdolan®		
Nurofen®		
Perdolan®		
Nurofen®		
Perdolan®		

+ 3 uur
+ 3 uur
+ 3 uur
+ 3 uur
+ 3 uur
+ 3 uur

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw •


Diestersteenweg 425 • 3680 Maaseik •

tel. 089 50 50 50 • info@zmk.be

ZMKBR0229

Versie : 15/05/2020

Auteur : Dienst Spoedgevallen



PIJNMEDICATIE BIJ KINDEREN

ziekenhuis maas en kempen

Beste,

Ons team van artsen en verpleegkundigen wil uw kind helpen de pijn zo goed mogelijk te bestrijden. De hoeveelheid en aard van pijnstilling is afhankelijk van het soort ingreep, aandoening en tal van andere factoren.

De keuze van type van pijnstillers en hoeveelheid is verschillend bij iedere patiënt. Effectieve pijnstilling bevordert het genezingsproces. Uw kind zal zich beter voelen waardoor het ook de gewone activiteiten sneller kan hervatten en de eventuele wonde minder ongemakken geeft.

Het is belangrijk dat uw kind de voorgeschreven medicatie systematisch neemt. We raden aan om de laatste dosis in te nemen voor het slapen gaan om pijnvrij te zijn gedurende de nacht.

Indien het voorgestelde pijnschema uw kind onvoldoende pijnstilling zou bieden, kan u contact opnemen met de behandelende arts of huisarts. Indien u de behandelende arts of huisarts niet kan bereiken, kan u de dienst spoedgevallen contacteren op tel. 089/ 50 60 00

We wensen uw kind veel beterschap.

PERDOLAN® (PARACETAMOL) ZETPIL EN SIROOP

Perdolan® is een geneesmiddel op basis van paracetamol. Het is een doeltreffende keuze bij de symptomatische behandeling van koorts en pijn bij kinderen.

Voor elke leeftijd of gewichtscategorie bestaan er verschillende dosissen zetabletten en een siroop. Dosering in functie van het lichaamsgewicht heeft de voorkeur op dosering in functie van de leeftijd. Voor eenzelfde leeftijd is het gewicht namelijk zeer variabel van kind tot kind.

Perdolan® mag maximum 4 keer per dag gegeven worden om de 4 tot 6 uur.

Indien u Perdolan® siroop wenst te gebruiken raadpleegt u best de bijsluiter hiervan om de juiste dosis te geven. Het voorbeeld van de Perdolan® zetablet vindt u hieronder.

Perdolan® zetablet	
Gewicht	Dosis
< 5 kg	100 mg
< 10 kg	100 mg
10 – 15 kg	200 mg
16 – 20 kg	200 mg
21 – 30 kg	350 mg
>31 kg	350 mg

Indien de pijn of koorts van uw kind niet betert na 3 dagen neem dan contact op met de behandelende arts of huisarts.

NUROFEN® (IBUPROFEN) ZETPIL EN SIROOP

Nurofen® voor kinderen bevat als werkzaam bestanddeel ibuprofen, een geneesmiddel tegen pijn en koorts. Ibuprofen heeft ook een ontstekingsremmende werking.

Nurofen® niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 maanden of kinderen die minder dan 5 kg wegen, tenzij uw arts dit voorschrijft.

Er zijn verschillende soorten Nurofen® siroop naargelang gewicht en leeftijd van uw kind. In deze brochure maakt men gebruik van Nurofen® 2%. Deze verpakking bevat een doseerspuit waarmee u de juiste hoeveelheid geneesmiddel kan optrekken.

Indien nodig, deze dosis om de 6 à 8 uur herhalen met een maximum van 3 innames per dag.

Nurofen® kan ook toegediend worden in de vorm van een zetablet. Zie voorbeeld Nurofen® zetablet:

Nurofen® zetablet	
Gewicht	Dosis
6 kg tot 12,5 kg	60 mg
12,5 kg tot 20,5 kg	125 mg

GECOMBINEERD

Perdolan® (paracetamol) en Nurofen® (ibuprofen) mogen afwisselend van elkaar worden gegeven aan kinderen indien paracetamol of ibuprofen alleen niet voldoende is.

Aan de binnenkant van de brochure vindt u een schema hoe de combinatie van beide medicatie kan toegepast worden.