

## CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft kan u contact opnemen met

- Internistisch dagziekenhuis IDZ :  
Tel 089 50 64 31
- Raadpleging Inwendige Geneeskunde :  
Tel : 089 50 56 00

Bij vragen/problemen kan u contact nemen met het IDZ, uw behandelend arts of uw huisarts.

Bij acute problemen dient u zich te begeven naar de dienst spoedgevallen.



## INJECTAFER

ZMKBR0260

Versie : 6/03/2020

Auteur : Internistisch Dagziekenhuis

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw • Diestersteenweg 425 • 3680 Maaseik •

tel. 089 50 50 50 • [info@zmk.be](mailto:info@zmk.be)

ziekenhuis maas en kempen

Uw arts heeft u voorgeschreven om Injectafer toegediend te krijgen.

## WAT IS INJECTAFER

Injectafer is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van anemie (bloedarmoede). Het bevat ijzer in de vorm van een ijzerkoolhydraat. Ijzer is een essentieel element voor het zuurstofdragend vermogen van hemoglobine in de rode bloedcellen en van myoglobine in spierweefsel. Bovendien is ijzer betrokken bij meerdere functies noodzakelijk voor het in stand houden van leven in het menselijk lichaam.

## WAAROM INJECTAFER TOEDIENEN

Het doel van de behandeling is het aanvullen van ijzervoorraden in het lichaam en voor het behandelen van anemie, een tekort aan rode bloedcellen als gevolg van ijzerdeficiëntie. Injectafer wordt gebruikt voor het behandelen van patiënten met ijzergebrek als oraal toegediende ijzerpreparaten niet het beoogde resultaat behalen of niet gebruikt kunnen worden.

## VOORBEREIDING

Voordat de behandeling met Injectafer wordt gestart, zal de arts een bloedtest uitvoeren en uw gewicht bepalen om de voor u benodigde dosis Injectafer te bepalen.

## DAG VAN TOEDIENING

U meldt zich aan het onthaal van het ziekenhuis en laat zich inschrijven.

U wordt doorverwezen naar het Internistisch dagziekenhuis IDZ. Dit is route F27.

Op de afdeling krijgt u een relaxzetel toegewezen waar de behandeling zal plaats vinden.

## TOEDIENING

Injectafer wordt via een ader toegediend.

Per week kan maximaal 20 ml Injectafer toegediend worden, wat overeenkomt met 1000 mg ijzer.

## MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle medicatie kan ook Injectafer eventueel bijwerkingen veroorzaken. Het wel of niet optreden van bijwerkingen zegt niets over de werking van het medicijn.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn gewoonlijk mild van aard en verdwijnen vermoedelijk na korte tijd.

Hoofdpijn, duizeligheid, hoge bloeddruk, misselijkheid, reactie op de injectieplaats, gevoelloosheid of tintelend gevoel van de huid.

Informeer de behandelende arts zo snel mogelijk indien één van volgende bijwerkingen zich voordoet, zij kunnen wijzen op tekens van ernstige allergische reactie :

- Huiduitslag, jeuk, moeilijke ademhaling
- Piepende ademhaling en/of opzwellen van de lippen, tong , keel of andere lichaamsdelen.